


后悔药来了，这项技术再圆她们的“妈妈梦”

台州市立医院 2025年06月14日 10:13 浙江



近日，台州市立医院妇产科门诊接连传来两个好消息，两位接受腹腔镜下输卵管吻合术的患者李女士与张女士（均为化名）都成功自然受孕。柴芝红主任医师在同一天内见证了她们的喜悦。



两年前，**20岁**的李女士曾因宫外孕破裂大出血，切除了一侧输卵管。去年9月，她再次怀孕，但不幸的是——**这次依旧是异位妊娠**，受精卵附着在了仅存的输卵管上，如果再次切除输卵管，那么这位年轻姑娘将再无自然妊娠的可能。不甘心的她终于在多番打听之后，找到了**台州市立医院妇产科主任医师柴芝红**。

今年1月份，已经生育过两个孩子的张女士也来到了柴芝红的诊间，她告诉柴医生：自己已经**38岁**，想要再拥有第三个孩子，无奈**10年前生下二胎后便做了输卵管绝育术**，如今该怎么办？

虽然两位患者的情况并不相同，但都面临着**输卵管问题导致的生育障碍**。输卵管是女性体内一对细长而弯曲的肌性管道，一般长8~14cm，位于阔韧带上缘内，内侧与子宫角相连通，外端游离呈伞状，与卵巢相近。它就像是一条高速公路，负责把受精卵运送到子宫里。如果这条高速公路出了问题，比如堵塞、断开或者不通畅，卵子和精子无法结合，即便结合，受精卵也无法顺利到达目的地，也就无法成功怀上宝宝。经过讨论，柴医生团队为两位患者量身定制了个性化治疗方案。



李女士的情况比较特殊，目前仅有一侧输卵管，**保住这条自然妊娠的唯一通道迫在眉睫**，且此次异位妊娠包块大，伴少量腹腔内出血，于是柴主任建议**分开做两次手术**：第一次手术切开输卵管，取出胚胎并清理干净。待身体休养好，预计2-3个月后可做第二次手术，通过腹腔镜下输卵管吻合术将切开的输卵管缝合。这个方案既能解决当下异位妊娠问题，又能保留输卵管，留下今后自然生育的希望。

而张女士的关键在于要**复通已经结扎的输卵管**，需要精准操作来恢复输卵管的通畅性，这样才能发挥输卵管的正常功能，所以腹腔镜下输卵管吻合术无疑是最佳方案。

做好了充足的准备后，去年11月，李女士接受了第一次手术，术后恢复良好。


到了今年1月份，调整好状态的李女士按照计划接受了**腹腔镜下输卵管吻合术**。这是一项精细的手术，需要医生具备精湛的技术和丰富的经验。凭借着娴熟的手术技巧，在腹腔镜下，柴医生带领手术团队精准找到输卵管的断端，并进行吻合修复，最大程度保留了输卵管的功能，手术圆满成功。

同月，张女士也在柴主任团队的帮助下顺利完成了输卵管的复通。

输卵管问题圆满解决了，李女士与张女士重新燃起了做母亲的希望。柴医生团队继续为她们护航，通过提供**专业的康复指导和备孕监测**，助她们早日好“孕”。



生机勃勃的5月，李女士和张女士怀揣希望先后回来复诊，通过完善血β-HCG及子宫附件B超检查，她们终于等到了梦想中的时刻：**检查结果均提示怀孕，且都是宫内成功受孕。**得知喜讯的李女士和张女士喜出望外，迫不及待地与家人分享喜悦，接下来她们将继续在台州市立医院做好产检，等待着宝宝降生。



什么是腹腔镜下输卵管吻合术

在腹腔镜下切除输卵管的瘢痕组织或炎症部分，重新将输卵管两端再吻合，在最大程度上保护和保留正常的输卵管。



手术适应症

1. **输卵管绝育术后**：输卵管结扎绝育术后，又因各种原因希望继续生育者。
2. **输卵管阻塞性不孕**：输卵管因炎症、感染等导致管腔粘连、堵塞，经检查确诊为输卵管阻塞，且排除其他不孕因素，有生育需求者。
3. **输卵管发育异常**：先天发育异常导致输卵管功能异常，影响受孕，可通过手术切除异常部位，并重新吻合输卵管。
4. **输卵管妊娠史**：既往有输卵管妊娠史，尤其是保守性手术治疗，若输卵管仍有部分功能，可考虑进行输卵管吻合术，以保留生育能力。



手术优势

- 1. 创伤小：**相比传统开腹手术，只需在腹部打几个小孔，对腹壁的损伤明显减小，术后疼痛轻，恢复快，住院时间短，一般术后1-2天即可出院。
- 2. 视野清晰：**腹腔镜可将盆腔内的情况放大并清晰地显示在屏幕上，医生能更准确地观察输卵管的走行、形态、有无粘连及阻塞部位等情况，有助于提高手术的精准度，减少误操作。
- 3. 操作精细：**借助腹腔镜的高清视野和精细器械，医生可以更精准地分离粘连组织、切除病变部位以及进行输卵管的吻合操作，最大程度地保留输卵管的正常结构和功能，提高手术成功率。
- 4. 并发症少：**由于手术创伤小，对盆腔内组织的干扰小，术后盆腔粘连的发生率相对较低，降低了因粘连导致的再次手术风险及其他并发症的发生。
- 5. 美观：**腹部切口小，术后瘢痕不明显，对患者的外观影响较小，尤其适合对外观有较高要求的患者。
- 6. 可同时处理其他病变：**在进行输卵管吻合术的同时，如果发现盆腔内存在其他病变，如卵巢囊肿、子宫肌瘤、盆腔粘连等，可以一并进行处理，减少患者再次手术的痛苦和风险。



手术禁忌人群

存在严重盆腔粘连；严重输卵管病变或损伤者；盆腔存在活动性炎症者；高龄和卵巢早衰者；患有严重内、外科疾病、或者恶性肿瘤者以及男性因素不孕未纠正者，不适合进行该项手术。



台州市立医院妇产科下设妇科专科和产科专科，其中妇科专科是椒江区重点学科，并与上海肿瘤医院建立合作联盟，是技术力量雄厚，临床经验丰富，诊疗设备先进，集医疗、科研、教学为一体的临床专科。设有普通妇科、妇科肿瘤、不孕不育、尿失禁、盆底疾病、计划生育、宫颈疾病、私密整形、更年期骨质疏松症等亚专科，拥有蔡仙丽名医工作室。

现有硕士生导师1人、副教授2人、主任医师8人、副主任医师9人、硕士8人，专科常规开展经阴道、经脐单孔腹腔镜手术，无气腹悬吊式腹腔镜手术，宫腹腔镜下各类手术，宫颈LEEP、冷刀、激光，盆腔磁疗，盆底重

建术，尿失禁，子宫脱垂子宫托，3D束带阴道紧缩术、小阴唇整形术等私密整形治疗。



柴芝红 妇产科主任医师

擅长：单孔腔镜微创，及妇科肿瘤、宫颈疾病、月经不调、不孕不育、盆底疾病、更年期骨质疏松、子宫脱垂尿失禁等诊治，私密整形。

坐诊时间：

新院区（周一、周三、周五、周六上午；周三下午特需）

老院区（周日上午）



作者 | 妇产科 邱晓晓

编辑排版 | 宣传统战部

审核 | 柴芝红 吴莎



扫码关注
台州市立医院
微信公众号



扫码关注
台州市立医院眼科中心
微信公众号



微信扫码了解政策
一键进入医保办事



市立高光 · 目录

[上一篇 · 弹拨中指 解惑病因 精心施治 效果明显](#)

2025/6/16 08:23

后悔药来了，这项技术再圆她们的“妈妈梦”