

@2型糖尿病患者，这项临床研究诚邀你参加

台州市立医院 2025年09月05日 16:39 浙江



体检预约

点击直达“健康管理中心”一站式服务

吐槽点赞

点击直达“市立心声码”填写页面



在生活节奏不断加快的当下，糖尿病如同潜伏的“健康刺客”，威胁着人们的健康。而**2型糖尿病（T2DM）**作为全球最常见的糖尿病类型，占糖尿病患者90%以上，**多见于成年人，但近年来青少年的发病率也逐渐上升。**

2型糖尿病主要特征包括**胰岛素抵抗**（细胞对胰岛素的敏感性下降）和**胰岛β细胞功能的逐渐衰退**（胰岛素分泌不足），这两个主要原因导致的血糖水平持续性升高。因此**2型糖尿病患者需要终身的血糖管理，目标是控制血糖达标**（HbA1c通常建议<7%，老年或有严重并发症者可适当放宽），同时管理体重、血压和血脂，降低心血管事件发生风险等。

针对2型糖尿病，目前临床上常见的降糖药物包括：

- 一线基础用药：二甲双胍；
- 新型口服降糖药物：SGLT-2抑制剂；
- “智能”肠促胰素类药物：GLP-1受体激动剂；
- 温和型口服药：DPP-4抑制剂；
- 传统促泌剂：磺脲类与格列奈类；
- 终极武器：胰岛素等。

利拉鲁肽（Liraglutide）是一种胰高糖素样肽-1受体激动剂（GLP-1 RA），属于“智能”肠促胰素类药物，通过模拟内源性GLP-1的作用机制，在降糖、减重、心血管、肾脏保护等方面具有显著优势。

招募公告

我院正在进行一项多中心、随机、开放、阳性药平行对照的Ⅲ期临床研究，评价利拉鲁肽注射液和诺和力在二甲双胍单药治疗控制不佳的2型糖尿病患者中的有效性和安全性。

本试验已经获得国家药品监督管理局的临床试验通知书（国家药品监督管理局药物临床试验批件号：2024LP01783）。

入选标准

- **01** 年龄范围为18周岁至75周岁（含边界值），性别不限；体重指数（BMI） $\geq 20\text{ kg/m}^2$ ；
- **02** 符合世界卫生组织（WHO）1999年颁布的糖尿病诊断标准，经临床确诊为2型糖尿病至少6个月；
- **03** 受试者需接受稳定剂量的二甲双胍单药治疗至少6周，稳定剂量定义为每日总剂量保持稳定且不低于1500mg（或最大耐受剂量 $\geq 1000\text{mg}$ ）；
- **04** 筛选时，糖化血红蛋白（HbA1c） $\geq 7.0\%$ 且 $\leq 11.0\%$ ；
- **05** 受试者自愿参加本研究并签署知情同意书，能够理解并且愿意遵守研究方案要求（包括给药方案、饮食运动、血糖监测等）。

如果您有意向参加，请与研究联系人联系，我们将向您详细地介绍本研究，并初步判断您是否符合入选要求，即使您不愿参加本研究，也不会受到任何不利影响。您的个人信息将被保密。

您可以通过以下方式进行咨询：

联系人：陆助理

联系电话：18069034220

地址：台州市立医院新院区门诊大楼2楼第二诊区内分泌科（浙江省台州市椒江区市府大道(东)581号）



供稿 | 内分泌科 张霞霞



扫码关注
台州市立医院
微信公众号





台州市立医院

台州学院附属市立医院

扫码关注

台州市立医院眼科中心
微信公众号



微信扫码了解政策
一键进入医保办事



—— 医保政策宣传码 ——



市立要闻 · 目录 ≡

＜ 上一篇 · 以心迎新，蓄力启航 | 台州市立医院2025年新员工岗前培训系列活动圆满收官！